



Drontal®

Как сохранить здоровье питомцев и своей семьи

- ▶ ответы педиатров
- ▶ советы ветеринаров
- ▶ основные правила защиты




Невидимая угроза

Все владельцы животных согласятся с тем, что четвероногий друг в доме – это полноправный член семьи. Чтобы приятные и радостные минуты общения и любви, которые дарит нам питомец, были как можно дольше, необходимо заботиться о его здоровье и благополучии.

В большинстве случаев заражение гельминтами протекает без внешних симптомов и не будет фатальным для Вашей собаки или кошки. Но отрицательное влияние, которое оказывают гельминты на организм, настолько велико и многогранно, что может спровоцировать серьезные нарушения здоровья.

Пути заражения собак и кошек гельминтами:



В особенной зоне риска:

1. **Животные,** которым не проводится регулярная дегельминтизация.
2. **Кошки и собаки,** которые выходят на улицу или имеют возможность охотиться, так как могут заразиться гельминтами при контакте с другими животными, в том числе из дикой фауны.
3. **Щенки и котята** из-за не сформированной иммунной защиты. Их заражение гельминтами происходит еще внутриутробно или после рождения с молоком матери.
4. **Животные,** которые не обрабатываются регулярно против блох. Блохи могут быть переносчиками личинок ленточных гельминтов.
5. **Животные из питомников (или приютов),** поскольку они подвержены заражению многими видами гельминтов.
6. **Путешествующие животные,** так как не имеют иммунитета к гельминтам, распространенным на отдаленной от их обычной среды обитания территории.

Люди могут легко заразиться гельминтами от питомцев:

- При уходе, чистке;
- Во время тесного физического контакта, при поглаживании, объятиях;
- При облизывании животным лица, продуктов и т.д.
- Яйца гельминтов животных могут быть прихвачены с почвы, песочницы, травы, асфальта и занесены в дом с невымытыми руками или обувью.

Drontal®

Это необходимо знать каждому

Информация педиатров

1. Никто не застрахован от заражения гельминтами.

Риск заражения особенно возрастает, если в семье есть домашний любимец. Из 82 видов гельминтов, которые зарегистрированы у кошек и собак, 32 могут паразитировать у человека. Зараженность домашних собак и кошек достигает до 78%, а дикие и бездомные животные заражены, как правило, 100%.²

2. Все без исключения возрастные группы населения подвержены гельминтозам.

В Украине ежегодно регистрируется 300 - 400 тысяч случаев гельминтозов. Но особенно распространены гельминтозы среди детей (80% случаев), иммунная система которых еще не достаточно сформирована, а при глистной инвазии значительно ослабевает. Чаще болеют дети возрастом 2-7 лет из-за отсутствия навыков личной гигиены, не сформированных защитных барьеров и низкого уровня кислотности желудка.^{1,3}

3. Глистные инвазии занимают первое место среди причин, способных вызвать вторичный иммунодефицит.

«Доказано, что у зараженных гельминтами детей снижается выработка защитных антител при вакцинации против дифтерии и кори, ухудшается формирование иммунитета при ревакцинации против столбняка». Профессор Г.В. Бекетова.¹

Патологическое воздействие гельминтов на организм связано, как с прямым их действием (механическим нарушением слизистой оболочки кишечника, желчевыводящих путей, поджелудочной железы), так и опосредствованно – «поломками» в работе иммунной системы, многочисленными аллергическими реакциями и даже онкологическими заболеваниями.

Гельминтозы у детей приводят к задержке физического и психического развития.

Более 100 миллионов детей в мире вследствие гельминтозов имеют задержки роста и умственного развития.¹

«У детей, болеющих бронхиальной астмой, также с рецидивирующими бронхитами, обнаруживали токсокары - 19,2%. У детей с atopическим дерматитом глисты выявляются у 69,1%, лямблии - 78,5%».³

4. Диагностировать гельминтозы довольно сложно,

информативность методов диагностики колеблется от 12-20% при обычном анализе кала и до 70-80% при иммунологических анализах.¹

Светлана Ониско, практикующий врач-педиатр, УДСБ «Охматдет» (педиатрический стаж – 19 лет):

«Для диагностики гельминтозов обычно назначают анализы кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз. Причем сдавать их нужно как минимум 3-5 дней подряд, поскольку яйца глистов бывают не в каждой порции кала. В случаях повышенного риска инфицирования глистами (например, контакт с животными) желательно пройти углубленное обследование, включающее специальные анализы крови, выявляющие антитела к антигенам гельминтов».⁸

5. Дегельминтизация питомцев не менее 4 раз в год

надежными средствами – залог здоровья всей семьи. Угроза, которую представляют собой гельминты, может быть снижена только благодаря образовательным программам и дегельминтизации. В виду большого спектра гельминтов, разного цикла их развития, а также постоянно существующей угрозы заражения, **дегельминтизация должна быть плановой и регулярной процедурой.** Оптимальный режим дегельминтизации, рекомендованный Европейским Сообществом по борьбе с паразитами домашних животных (ESCCAP), - ежеквартально, 4 раза в год!¹⁰

Невидимая угроза – ГЕЛЬМИНТЫ.

Общий риск для животных и людей.

Гельминтозы собак

Паразиты	Дронтал [®] плюс	Распространенность ^{5, 6}	Опасность для человека ⁷
Toxocara canis	✓	☆☆☆	☆☆☆
Toxascaris leonina	✓	☆☆☆	☆☆☆
Ancylostoma caninum	✓	☆	☆☆☆
Uncinaria stenocephala	✓	☆☆	☆☆☆
Trichuris vulpis	✓	☆	поражает только собак
Dipylidium caninum	✓	☆☆	☆
Taenia все виды	✓	☆	☆
Echinococcus granulosus	✓	☆	☆☆☆
Echinococcus multilocularis	✓	☆	☆☆☆
Mesocestoides все виды	✓	☆	☆
Lamblia (согласно исследованиям ⁹)	✓	☆☆☆	☆☆

☆ - в небольшой степени, ☆☆ - в средней степени, ☆☆☆ - в большой степени

Гельминтозы кошек

Паразиты	Дронтал® для кошек	Распространенность ^{5,6}	Опасность для человека ⁷
Toxocara cati	✓	☆☆☆	☆☆☆
Ancylostoma все виды	✓	☆☆	☆☆☆
Dipylidium caninum	✓	☆	☆
Taenia taeniaformis	✓	☆	☆
Echinococcus multilocularis	✓	☆	☆☆☆
Mesocestoides все виды	✓	☆	☆
Joyeuxiella pasqualei	✓	☆	☆

☆ - в небольшой степени, ☆☆ - в средней степени, ☆☆☆ - в большой степени

«Родители часто спрашивают: нужны ли детям в качестве профилактики таблетки от глистов, когда в доме живет собака?»

На самом деле животному раз в три месяца ветеринары должны провести антигельминтную терапию. Если это соблюдается, а у вашего чада нет признаков заражения, то и лечить его не нужно»

Главный детский инфекционист Минздрава Украины, д.м.н., профессор **Сергей Крамарев⁴**

Дронтал® защищает от ВСЕХ видов желудочно-кишечных гельминтов, наиболее распространенных в Украине и ОПАСНЫХ для здоровья животных и человека.^{5,6,7}

Drontal®

Некоторые гельминты животных, которые опасны для людей⁸

Токсокароз

Главный детский инфекционист Минздрава Украины, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор **Сергей Крамарев**:

«Согласно статистике ежегодно в Украине регистрируется 224 случая на 100 тыс. населения. Суть токсокароза такова, что при попадании личинки в какой либо внутренний орган человека, она не просто там существует, а повреждает его!»

Токсокароз у людей лечится очень тяжело, довольно длительными курсами (продолжительность одного курса до 10 дней, а нужно не мене 4-5 курсов), Некоторые клиницисты говорят о 10 курсах. Если токсокароз не лечить, то прогноз будет плачевным. Например, при глазной форме ребенок может ослепнуть. Основная профилактика токсокароза - это дегельминтизация питомцев.

Тут должен квалифицировано работать ветеринарный врач: раз в квартал назначать антигельминтную терапию животным, проживающим в семьях. Если собака ежеквартально хорошо продегельминтизирована, то профилактику для ребенка проводить уже не надо».

Эхинококкоз

Профессор кафедры детской хирургии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, **Василий Притула**:

«Эхинококкоз - одно из самых распространенных паразитарных заболеваний с хроническим и длительным течением, при котором риск развития осложнений, а также инвалидизации очень высокий.

Человек заражается эхинококком от домашних животных. Главным источником заражения являются собаки. Кроме любителей собак и детей, в группу риска входят люди, работающие с животными.

У детей эхинококкоз встречается в любом возрасте, даже среди младенцев и детей грудного возраста зарегистрированы случаи этого паразитарного заболевания».

«Частая локализация эхинококковой кисты - печень (около 80%), на втором месте по частоте поражения эхинококком идут легкие, реже - почки, селезенка, поджелудочная железа, брюшная полость, кости, головной мозг и т.д..

С целью предупреждения заражения собак эхинококкозом необходимо регулярно проводить дегельминтизацию домашних и служебных собак проверенными надежными средствами».

Лямблиоз

Главный детский инфекционист Минздрава Украины, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор **Сергей Крамарев:**

«В Украине уровень заболеваемости держится на достаточно высоких цифрах: ежегодно регистрируют 30-40 тысяч случаев лямблиоза, 65% из них – у детей.

Этот гельминтоз наиболее широко распространен среди детей школьного возраста (7-14 лет), хотя зарегистрированы случаи заболевания и у новорожденных.

Основным источником заражения является человек, дополнительным – животные (кошки, собаки). Во дворах и дошкольных учреждениях источником инфицирования часто являются песочницы, которые загрязняются кошками и собаками, возможно заражение через белье, игрушки, посуду».



Drontal®

Основные правила защиты домашних животных и их владельцев

- 1. Личная гигиена.** Мойте руки водой с мылом после того, как гладите животных, кормите, осуществляете уход или любым другим способом контактируете с ними, их жилищем или отходами их жизнедеятельности.
- 2. Питание домашнего животного.** Снизьте риск заражения для питомца, например, кормите его продуктами, подвергающимся термической обработке, или фабричным кормом и следите за тем, чтобы у него всегда была питьевая вода.
- 3. Среда.** Регулярно чистите среду обитания от экскрементов животного.
- 4. Контроль.** Регулярно ходите на прием к ветеринарному доктору для проведения осмотра.
- 5. Регулярная дегельминтизация.** Дегельминтизируйте Вашу собаку или кошку каждые 3 месяца (4 раза в год, согласно рекомендациям ESCCAP*). Если в одном доме живут несколько домашних животных, необходимо проводить дегельминтизацию их всех одновременно, чтобы не допустить перекрестного заражения.¹⁰
- 6. Дети.** Сведите к минимуму контакт детей с потенциально зараженной средой, научите детей правилам личной гигиены. Закрывайте песочницы, когда они не используются, чтобы защитить от попадания в них яиц гельминтов. Следите за тем, чтобы у детей ногти были коротко острижены.
- 7. Блохи, стоп!** Следите за тем, чтобы у Вашего животного не было блох. Проглатывание блох является одним из путей заражения ленточными гельминтами.
- 8. Гигиена домашнего животного** Осуществляйте регулярный уход за шерстью, чтобы свести к минимуму риск заражения яйцами гельминтов.

* Европейское научное объединение по паразитологии мелких домашних животных;

Обнимайтесь без страха заразиться!

Программа дегельминтизации животных препаратом
Дронтал® плюс и Дронтал® для кошек:

Обработка	Возраст	Для взрослых животных
Первая	2 недели	Каждые 3 месяца. В случае повышенного риска заражения - ежемесячно.
Вторая	4 недели	
Третья	8 недель	
Четвертая	12 недель	
Пятая	4 месяца	Самок перед спариванием и за 10 дней до родов. Все последующие дегельминтизации во время лактации проводить в то же время, что и щенкам/котяткам.
Шестая	5 месяцев	
Седьмая	6 месяцев	
Восьмая	9 месяцев	
Девятая и последующие	Каждые 3 месяца	

При лямблиозе у собак режим применения Дронтал® плюс: 1 таблетка на 10 кг веса, 3 дня подряд

Дронтал® удобен в применении для владельца и для животного.

Дронтал® плюс для собак можно давать животному с кормом или без него. Таблетка имеет привлекательный **аромат говядины**.

9 из 10 собак принимают его по собственному желанию.*

Дронтал® для кошек имеет удобную форму эллипса.

Таблетки эллипсоидной формы легко проглатываются.

9 из 10 владельцев кошек предпочитают его круглым таблеткам.**

* Внутреннее исследование вкусовой привлекательности компании "Байер" 2008г.,

** Исследование рынка Великобритании 2010г.

Дронтал® – антигельминтик, которому можно доверять, потому что:

- Дронтал® признан в мире: Дронтал® плюс – зарегистрирован в 97-ми странах мира, Дронтал® для кошек – в 70-ти.
- Дронтал® имеет широкий спектр действия.
Дронтал® защищает от всех видов гельминтов желудочно-кишечного тракта, которые наиболее часто встречаются в Украине и Европе.^{5,6}

Дронтал® - здоровье всей семьи!

1. Гельминтозы в Украине: современное состояние проблемы. – Газета «Новости медицины и фармации», №10 (416) 2012, www.mif-ua.com/archive/article/30576
2. Гельминтозы – чи є актуальною ця проблема? Інформація для хворих. Головний військово-медичний клінічний орден Червоної Зірки центр "ГВКГ". www.gvkg.kiev.ua
3. Гельминты (глисты) и аллергия. Лечение гельминтов (лечение глистов) у детей – современные подходы evroklinika.com
4. Детский инфекционист Сергей Крамарев: «Самое опасное при пищевом отравлении ребенка – обезвоживание организма». www.fakty.ua/183568-detskiy-infekcionista-sergej-kramarev-samoe-opasnoe-pri-pishevom-otravlenii-rebenka-obezvozhivanie-organizma
5. Клименко О.С. Аналіз епізоотологічної ситуації щодо гельмінтозів собак у приватних господарствах Полтавської області. – вісник Полтавської державної аграрної академії, №3 2011 р., ст.127-129
6. Ліпін А., Санін А., Зінченко Є. Гельмінтози. - Ветеринарний довідник. Традиційні та нетрадиційні методи лікування кішок., 2002. – Медична бібліотека: навчальна і довідкова література на медичну тематику на українській мові. www.medbib.in.ua/gelmintozyi.html
7. Сергиенко Е.И. Распространенные гельминтозы пищеварительного тракта человека. Журнал «Лики України», – №7, (153) 2011, ст. 18 - 24
8. По материалам эксклюзивного интервью для компании Байер.
9. A. Schäusche, H. Melhorn Effects of Febantel and Pyrantel Embonate (Dronтал® Puppy) on in vitro Cultivated Giardia Trophozoites. Department of Parasitology, Heinrich - Heine- University, Dusseldorf, Germany. Chapter 20. p 209-214.
10. European Scientific Council Companion Animal Parasites. Worm Control in dogs and cats. Guideline 01, Second Edition - September 2010.



Bayer

ООО «БАЙЕР»
ул. Верхний Вал, 4-Б
тел.: 044 220 33 41
www.bayer.ua

РС Дронтал® для кошек AA-02378-01-12 от 18.12.2013
Дронтал® плюс со вкусом мяса AA-00880-01-10 от 18.12.2013

На правах рекламы